



Sifatec®

# Desmonte A

480 SCA

## 2,4-D amina

Herbicida / Solución Concentrada Acuosa

### Herbicida agrícola

**RSCO-HEDE-0222-416-014-049**

**DESMONTE A®** es derivado del ácido diclorofenoxiacético con actividad auxínica capaz de actuar sobre los mecanismos que regulan el crecimiento vegetativo de las plantas con 480g de ingrediente activo por litro de producto.

**DESMONTE A®** Es un herbicida post-emergente selectivo a para el control de las malezas de hoja ancha, es de acción sistémica que se absorbe por el follaje y raíces. Es traslocado en la planta por el floema y xilema, acumulándose en las regiones meristemáticas de los rebrotes y raíces.

**DESMONTE A®** Actúa como inhibidor del crecimiento. Estimulan la síntesis de los ácidos nucleicos y de las proteínas, afectando la actividad de las enzimas, la respiración y la división celular. Las especies de hoja ancha muestran hojas, tallos y raíces deformados.

**DESMONTE A®** se recomienda aplicar este producto de manera terrestre y cuando haya buena humedad en el suelo para un efecto más rápido del mismo.

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios; sin embargo, es necesario que la mezcla sólo se haga con productos debidamente registrados por COFEPRIS.

Malezas que controla:

MALEZA QUE CONTROLA	NOMBRE CIENTÍFICO
Bledo o quelite	<i>Amaranthus sp.</i>
Cardos	<i>Cirsium sp</i>
Correhuela	<i>Convolvulus arvensis</i>
Diente de León	<i>Taraxacum officinale</i>
Moztaza	<i>Brassica sp</i>
Orozuz	<i>Glycyrrhiza glabra</i>
Ortiga	<i>Urtica sp.</i>
Rábano Silvestre	<i>Raphanus raphanistrum</i>

# FICHA TÉCNICA



**Sifatec**  
*¡Para quien sólo usa lo mejor!*

Sifatec®

# Desmonte A

480 SCA

## 2,4-D amina

Herbicida / Solución Concentrada Acuosa

### Recomendaciones a cultivos

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
AVENA, TRIGO, CEBADA Y CENTENO	0.625 – 1.25 1.25 – 2	En siembras de primavera, desde que la planta tiene 15 cm de altura hasta principios del encañado. En granos sembrados en invierno.
MAÍZ Y SORGO	1.6 – 3.5 1 - 2	El tratamiento debe hacerse cuando las malezas han nacido y cuando el cultivo tenga una altura aproximada de 15 a 25 cm. La aplicación debe ser dirigida a la parte superior de las malezas, evitando aplicar directamente el herbicida sobre las plantas de maíz y sorgo.
ARROZ	1 – 1.25	Aplíquese de 4 a 8 semanas después de nacido el cultivo. Cuando el arroz es de inundación, aplique de 7 a 9 semanas después de la siembra cuando han emergido sobre el agua y las hojas se encuentren erectas. Nunca se aplique el producto cuando el arroz se encuentre en la época de plántula.
CAÑA DE AZÚCAR	2.5 – 4 1.2 – 2.4	Para el control de malezas de hoja ancha, el tratamiento deberá hacerse cuando las hierbas son más jóvenes y están creciendo vigorosamente. La mejor época de aplicación es cuando el pelillo tenga de 30 a 50 cm de altura. Si aporca, trate después sin mojar la caña

Presentación: Botella PET 950 ml y garrafa HDPE de 5 L.